

BIODYL®

Affections traumatiques, locomotrices algiques, musculaires

COMPOSITION :

Solution injectable :

SELENIUM (s.f. de sélénite de sodium).....0,045 g
POTASSIUM ASPARTATE hémihydraté.....1,000 g
MAGNESIUM ASPARTATE tétrahydraté.....1,500 g
Excipient renfermant cyanocobalamine 0,050 g et glycine.....5,000 g.....q.s.p.....100 ml

PROPRIETES PHARMACEUTIQUES :

Les constituants de BIODYL® sont bien connus pour leur propriété reconstituante de la cellule et favorisant de tous les métabolismes aboutissant à la régénération protéique du muscle notamment des muscles cardiaques. Grâce à son sélénite de sodium, BIODYL® a été conçu pour lutter contre les myopathies.

INDICATIONS THERAPEUTIQUES :

Chez les veaux, agneaux, porcins, équins, chiens et chats : prévention et traitement des carences en sélénium : Myopathies, dystrophies musculaires.

ADMINISTRATION ET POSOLOGIE :

Voies I.M., S.C. ou I.V. selon les espèces.

- Veaux : voie intramusculaire.
 - Prévention : 2 à 4 injections de 10 ml à 8 jours d'intervalle.
 - Traitement : 3 à 4 injections de 10 ml à 24 heures d'intervalle.
- Agneaux : voie intramusculaire.
 - Prévention : 2 à 4 injections de 2 ml à 4 jours d'intervalle.
- Porcs : voie intramusculaire.
 - De 2 à 10 kg : 2 ml par jour.
 - De 10 à 50 kg : 5 ml par jour.
 - De 50 à 100 kg : 10 ml par jour.
- Equins : voie intraveineuse lente : Injection de 20 ml tous les 4 à 5 jours (4 à 5 injections au total).
- Chiens : voie intramusculaire : 2 à 5 ml par jour.
- Chats : voie sous-cutanée : 1 ml par jour.

PRECAUTIONS :

Le nombre d'injections n'excédera pas, en général, 3 à 4 injections séparées par un intervalle de 24 ou 48 heures.

DELAI D'ATTENTE :

Viandes et abats : 4 jours.
Lait : nul.

CONSERVATION :

Tenir à l'abri de la chaleur.

PRESENTATION :

Flacon de 50 ml.

PRODUIT MERIAL